

Kennishiaat	Onderzoeksvraag	Opgepakt in onderzoek?	Toelichting	Naam studie
Astma en zwangerschap	Leidt een maandelijkse follow -up van zwangere astma patiënten tot een afname aan longaanvalfrequentie en minder neonatale en maternale complicaties in vergelijking met minder frequente of symptoom geleide follow-up	nee		
Astma en exacerbaties. Kennis over exacerbaties en behandelduur	Wat is de optimale behandeling van een longaanval bij astma; treatable traits versus standard care?	nee	verkorte aanvraag ingediend bij ZE&GG	
COPD exacerbatie behandelplan	Wat is de waarde van corticosteroïden en/of antibiotica bij de behandeling van een longaanval bij COPD en hebben biomarkers een plaats in de diagnostiek van een acute longaanval, waarop de therapie kan worden aangepast?	ja		PRECISION studie
Welke behandeling (nachtelijke zuurstofsuppletie, CPAP, Diamox) is het meest effectief bij patiënten met CSAS a.g.v.	Wat is de effectiviteit van nachtelijke zuurstofsuppletie bij patiënten met CSAS als gevolg van cardiaal lijden?	nee		
Methotrexaat vs. steroïden voor eerstelijnsbehandeling pulmonale sarcoïdose + voorspellers respons	Wat is de beste eerstelijnsbehandeling voor pulmonale sarcoïdose; prednison of methotrexaat?	ja		PREDMETH studie
Pleuraempyeem VATS vs. drain	Leidt een VATS procedure 1-2 dagen na vaststelling van een empyeem tot een kortere opnameduur in vergelijking met thoraxdrainage en fibrinolyticoediening?	nee	beoordeeld als niet haalbaar	
Wat is effect HT zout bronchiëctasieën?	Heeft vernevelen van hypertoon zout bij non-CF bronchiëctasieën meerwaarde ten opzichte van mucolytica en/of isotoon zout op kwaliteit van leven en/of longaanvalfrequentie?	nee		
1e pseudomonas – beste therapie bij COPD/non-CF?	Wat is de optimale behandeling om Pseudomonas eradication te bereiken bij patiënten met bronchiëctasieën, oraal ciprofloxacine of een alternatieve behandeling met inhalatie antibiotica?	nee		
Optimale follow-up bij radicaal behandeld longcarcinoom, hoe vaak en welke techniek?	Heeft het inzetten van een CT-scan in de follow-up van een radicaal behandeld longcarcinoom stadium 2 en 3 een meerwaarde ten opzichte van een gewone X-thorax op de mortaliteit?	nee	beoordeeld als niet haalbaar	
Opname intermediate-high risk longembolie. Bewaakt of afdeling etc.	Levert het bewaken van patiënten met een intermediate high risk op een bewaakte afdeling een overlevingsvoordeel of complicaties van de ingezette behandeling op t.o.v. een niet bewaakte afdeling?	nee	ingediend maar afgewezen	